

题中无圆心有圆 圆来就这么简单

卢妮 蔡海涛

福建省莆田第二中学

研究近年高考数学试题,发现解析几何对“椭圆”和“抛物线”的考查难度有所下降,“直线与圆”的地位大幅度提升,具有数学文化背景的题目层出不穷.其中,有一类圆的问题在已知条件中没有直接给出圆的有关信息,而是隐藏在条件中,需要通过分析转化,从而发现圆(或圆的方程),进而利用圆的知识求解,这类问题称为“隐形圆”问题.比如“蒙日圆”“阿波罗尼斯圆”等.“隐形圆”问题综合性强,充分考查了学生数形结合、化归与转化等数学思想方法,学生答题有一定的难度.本文以几道高考题和模拟题为例,探寻“隐形圆”问题求解策略.

一、利用圆的定义(到定点的距离等于定长的点的轨迹)确定隐形圆

例1 若与点 $A()$ 的距离为1且与点 $B()$ 的距离为3的直线恰好有两条,则实数的取值范围为_____.

解析 与定点 A 距离为1的点的轨迹为圆,所以与点 $A()$ 的距离为1的直线为圆的切线,同理与点 $B()$ 的距离为3的直线也以 B 为圆心,3为半径的圆的切线,故同时满足两个条件的直线应该为两圆的公切线,因为公切线恰为两条,所以两圆相交,则

$$- < |AB| < + , \text{ 所以 } \text{ 的取值范围为 } (- \sqrt{ }) \cup (+ \sqrt{ }).$$

点评 本题根据圆的定义得到隐圆,得到以点 $A()$ 和点 $B()$ 为圆心的两个圆,这是本题的关键,进而由已知条件得两圆位置关系,从而求得 的取值范围.

变式训练1: 若对任意 \in , 直线 $\alpha + \alpha = \alpha + \frac{\pi}{ } +$ 与圆 $C(-) + (- \sqrt{ }) =$ 均无公共点,则实数 的取值范围为_____.

解析 直线 的方程可化为: $- \alpha + - \sqrt{ } \alpha =$, $M(\sqrt{ })$ 到 的距离为4,所以 是以 M 为圆心,半径为4的定圆的切线系,故问题转化为圆 M 与圆 C 内含,易得 的取值范围为 $(- - -)$.

二、到两定点距离的平方和为定值确定隐形圆

例2 在平面直角坐标系 中,已知圆 $C(-) + (- +) =$,点 $A()$,若圆 C 上存在点 M ,满足 $MA + MO =$,则实数 的取值范围是_____.

解析 由 $MA + MO =$,可得点 M 满足方程为 $+ (-) =$,则问题转化为该圆与圆 C 有公共点,易得实数 的取值范围为 $[]$.

点评 本题关键在于确定动点 M 的位置, 根据点 M 到点 A 和点 O 的距离的平方和为定值, 从而确定隐圆, 突破了本题难点.

变式训练 2: (2017 北大自主招生) 正方形 $ABCD$ 与点 P 在同一平面内, 已知该正方形的边长为 1, 且 $|PA| + |PB| = |PC|$, 则 $|PD|$ 的最大值为 ()

$+\sqrt{2}$ $\sqrt{2}$ $+\sqrt{2}$ 前三个答案都不对

解析 建立直角坐标系, 设 $A(0, 0)$, $B(1, 0)$, $C(1, 1)$, $D(0, 1)$

由 $|PA| + |PB| = |PC|$ 得 $\sqrt{x^2 + y^2} + \sqrt{(x-1)^2 + y^2} = \sqrt{(x-1)^2 + (y-1)^2}$, 圆心 $M(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$, 则 $|PD|$ 的最大值为 $|MD| + r = \sqrt{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}$. 故选 $\frac{3\sqrt{2}}{2}$.

三、动点 P 对两定点 A 、 B 张角是 90° ($\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} = 0$ 或 $\overline{PA} \cdot \overline{PB} = 0$) 确定隐形圆

例 3 (2014 年高考四川卷·文 9) 设 $l \in \mathbb{R}$, 过定点 A 的动直线 $l_1: x + y - l = 0$ 和过定点 B 的动直线 $l_2: x - y + l = 0$ 交于点 P , 则 $PA + PB$ 的取值范围是 ()

A $[\sqrt{2}, \sqrt{2}]$ $[\sqrt{2}, \sqrt{2}]$ $[\sqrt{2}, \sqrt{2}]$ $[\sqrt{2}, \sqrt{2}]$

解析 易得 $A(0, 0)$, $B(1, 1)$, 分类讨论直线斜率存在与否, 当直线 $x + y - l = 0$ 斜率不存在时, 可得 $P(0, l)$. 当直线斜率存在时, 发现 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} = 0$, 从而知点 P 在以 AB 为直径的圆上, 当 P 与 A 或 B 点重合时, $PA + PB$ 取到最小值, 当 P 不与 A 或 B 点重合时, 由不等式的性质知 $PA + PB \leq \sqrt{PA^2 + PB^2} = \sqrt{2}$, 故选 $[\sqrt{2}, \sqrt{2}]$.

点评 本题解题的突破口是发现两条动直线的关系, 由 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} = 0$ 确定隐圆, 得到 P 点轨迹, 结合不等式性质求解.

变式训练 3 已知圆 $C: (x-1)^2 + (y-1)^2 = 1$ 和两点 $A(-1, 0)$, $B(1, 0)$, 若圆上存在点 P , 使得 $\angle APB = 90^\circ$, 则 l 的取值范围为_____.

解析 由已知得以 AB 为直径的圆与圆 C 有公共点, 易求得 l 的取值范围为 $[-1, 1]$.

四、两定点 A 、 B , 动点 P 满足 $\overline{PA} \cdot \overline{PB} = \lambda$ 确定隐形圆

例 4 (2017 年高考江苏卷·13) 在平面直角坐标系 xOy 中, $A(-1, 0)$, $B(1, 0)$, 点 P 在圆 $O: x^2 + y^2 = 1$ 上, 若 $\overline{PA} \cdot \overline{PB} \leq \frac{1}{2}$, 则点 P 的横坐标的取值范围是_____.

解析 设 $P(x, y)$ ，由 $\overline{PA} \cdot \overline{PB} \leq 0$ ，易得 $x^2 + y^2 - 2x - 2y \leq 0$ ，由 $\begin{cases} x + y = 1 \\ x - y = 0 \end{cases}$ ，可得

$A \begin{cases} x = -1 \\ y = -1 \end{cases}$ 或 $B \begin{cases} x = 1 \\ y = 1 \end{cases}$ ，由 $x^2 + y^2 - 2x - 2y \leq 0$ 得点 P 在圆左边弧 \widehat{AB} 上，结合限制条件

$-\sqrt{2} \leq x \leq \sqrt{2}$ ，可得点 P 横坐标的取值范围为 $[-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$ 。

点评 在平面内，若 A, B 为定点，且 $\overline{PA} \cdot \overline{PB} = \lambda$ ，则 P 的轨迹是以 M 为圆

心， $\sqrt{\lambda + \frac{1}{4}AB^2}$ 为半径的圆。本题 $\overline{PA} \cdot \overline{PB} \leq 0$ 确定隐圆，得到 P 点轨迹为圆左边弧 \widehat{AB} 上，

进而问题轻松获解。

变式训练4 已知点 $A(1, 1)$ ， $B(-1, -1)$ ，点 P 在直线 $x + y = 1$ 上，若满足等式 $\overline{AP} \cdot \overline{BP} + \lambda = 0$ 的点 P 有两个，则实数 λ 的取值范围是_____。

解析 设 $P(x, y)$ ，由 $\overline{AP} \cdot \overline{BP} + \lambda = 0$ 得 $(x-1)^2 + (y-1)^2 + \lambda = 0$ ，问题转化为直线与圆相交问题，所以 $\lambda < -2$ 。

五、两定点 A, B ，动点 P 满足 $\frac{PA}{PB} = \lambda$ ($\lambda > 1, \lambda \neq 1$) 确定隐形圆 (阿波罗尼斯圆)

例5 (2008年 高考江苏卷·13) 满足条件 $AB = 2$ ， $AC = \sqrt{2}BC$ 的三角形 ABC 面积的最大值为_____。

解析 设角 A, B, C 对边分别为 a, b, c ，以 \overline{AB} 的方向为 x 轴正方向，以 AB 的中点为坐标原点建立平面直角坐标系，设 $A(-1, 0)$ ， $B(1, 0)$ ，由 $AC = \sqrt{2}BC$ 得 $(x-1)^2 + y^2 = 2(x+1)^2 + y^2$ ，所以点 C 的轨迹是以 $(-\frac{1}{3}, 0)$ 为圆心， $\frac{2\sqrt{2}}{3}$ 为半径的圆，所以当点 C 到 AB 轴的距离最大时三角形的面积的最大，最大值为 $\frac{2\sqrt{2}}{3}$ 。

点评 在平面上给定两点 A, B ，设点 P 在同一平面上且满足 $\frac{PA}{PB} = \lambda$ ($\lambda > 1, \lambda \neq 1$)，点 P 的轨迹是一个以定比 λ 内分和外分定线段 AB 的两个分点的连线为直径的圆，这个圆称为阿波罗尼斯圆，简称阿氏圆。若学生掌握了阿波罗尼斯圆，本题不难获解。

变式训练5 在平面直角坐标系中，已知点 $A(1, 1)$ ， $B(-1, -1)$ ，若直线 $x + y = 1$ 上存在点 P 使得 $|PA| = -|PB|$ ，实数 λ 的取值范围为_____。

解析 点 P 阿波罗尼斯圆, 的取值范围为 $[-\sqrt{\quad}, \sqrt{\quad}]$.

六、由圆周角的性质确定隐形圆


例 6 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle C = \quad^\circ$, O 是 $\triangle ABC$ 的外心, 若 $\overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}$ ($\in \quad$), 则 $\quad + \quad$ 的取值范围是 \quad .

解析 $\angle AOB = \angle C = \quad^\circ$, 两边平方 $\overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}$ ($\in \quad$) 得 $\quad + \quad = \quad$ 结合基本不等式, 可得出 $\quad + \quad$ 的取值范围是 $[-\sqrt{\quad}]$.

点评 $\angle AOB = \angle C = \quad^\circ$ 知点 C 在以 O 为圆心, 半径 OA , 在优弧 AB 上.

变式训练 6 如图, 四边形 $AOCB$, $OA \perp OC$, $CA \perp CB$, 若 $AC = \quad$, $CB = \quad$, 则 OB 的取值范围是 \quad .

解析 点 O 在以 AC 为直径的圆上, OB 的取值范围是 $[\sqrt{\quad} - \sqrt{\quad}, \sqrt{\quad} + \sqrt{\quad}]$.



由以上例题分析可知, “隐形”问题着重考查化归与转化的思想在解题中的运用, 解决方法就是分析已知条件, 从条件出发探求动点轨迹, 把隐形轨迹显性化, 从而发现圆, 然后利用圆的知识求解问题.